



ACTIONIS[®] 50 mg/ml, SUSPENSIÓN INYECTABLE PARA BOVINO Y PORCINO



Antibacteriano en suspensión inyectable

COMPOSICIÓN POR ML

Ceftiofur (como hidrocloreuro) 50 mg

INDICACIONES

Bovino: Tratamiento de infecciones respiratorias asociadas con *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni*. Tratamiento de la necrobacilosis interdigital aguda (panadizo, pododermatitis), asociada con *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus* (*Porphyromonas asaccharolytica*). Tratamiento del componente bacteriano de la metritis aguda posparto (puerperal) en los 10 días siguientes al parto, asociada con *Escherichia coli*, *Archaeobacterium pyogenes* y *Fusobacterium necrophorum*, sensibles a ceftiofur.

Porcino: Tratamiento de infecciones respiratorias asociadas con *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Streptococcus suis*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: Subcutánea.

Porcino: Intramuscular.

No administrar por vía intravenosa

POSOLÓGÍA

Agitar vigorosamente hasta la completa resuspensión del producto.

Bovino: Infecciones respiratorias: 1 ml/50 kg p.v./día durante 3 a 5 días. Necrobacilosis interdigital aguda: 1 ml/50 kg p.v./día durante 3 días. Metritis aguda posparto en los 10 días siguientes al parto: 1 ml/50 kg p.v./día durante 5 días.

Porcino: 1 ml/16 kg p.v. durante 3 días.

Respetar volumen máximo por punto de inyección de 7 ml para bovino y 5 ml para porcino.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:

Bovino y porcino: 6 días

Leche: 0 horas.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No usar para la prevención de enfermedades ni como parte de programas sanitarios de baños. El tratamiento de grupos de animales debe limitarse estrictamente a brotes activos de enfermedades, de acuerdo con las condiciones de uso aprobadas. No usar como profilaxis en caso de retención de placenta.

PRESENTACIÓN

Envases con 100 y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2273 ESP