



CEFIMAM LACTACIÓN 75 MG

Antibacteriano en pomada intramamaria para vacas en lactación



COMPOSICIÓN POR JERINGA

Cefquinoma (como cefquinoma sulfato) 75 mg

INDICACIONES

Vacas en lactación:

Tratamiento de mastitis clínicas producidas por las siguientes bacterias sensibles a cefquinoma: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Escherichia coli*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramamaria.

POSOLOGÍA

1 jeringa/cuarterón inmediatamente después del ordeño.

Ordeñar a fondo los cuarterones afectados, limpiar adecuadamente y desinfectar el pezón y su orificio. Infundir lentamente el medicamento mediante un masaje suave en el pezón y en la ubre del animal afectado. Aplicar cada 12 horas después de cada uno de los tres ordeños sucesivos.

La jeringa debe ser de un solo uso.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 4 días.

Leche: 5 días (120 horas).

PRECAUCIONES ESPECIALES

El medicamento veterinario debe reservarse para el tratamiento de cuadros clínicos que hayan respondido mal o que previsiblemente responderán mal a otros grupos de antimicrobianos o antimicrobianos β -lactámicos de espectro estrecho.

Existe sensibilidad cruzada a cefalosporinas en bacterias sensibles al grupo de las cefalosporinas.

PRESENTACIÓN

Cajas de 12 y 24 jeringas.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 3110 ESP