



# CEFIMAM SECADO 150 MG

Antibacteriano en pomada intramamaria para vacas en secado



## COMPOSICIÓN POR JERINGA

Cefquinoma (como cefquinoma sulfato) ..... 150 mg

## INDICACIONES

### Vacas en secado:

Tratamiento de mamitis subclínicas y prevención de nuevas infecciones bacterianas de la ubre producidas por los siguientes organismos sensibles a cefquinoma: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae*, *Staphylococcus aureus*, estafilococos coagulasa negativos.

## CONTRAINDICACIONES

No usar en vacas con mamitis clínica.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramamaria.

## POSOLOGÍA

1 jeringa/cuarterón inmediatamente después del último ordeño.

Antes de la aplicación del medicamento veterinario, la ubre debe haberse vaciado completamente y el pezón y su orificio deben haberse limpiado y desinfectado minuciosamente con la toallita proporcionada. Dispersar el medicamento veterinario mediante un masaje suave en el pezón y la ubre.

Puede utilizarse durante la gestación.

Las jeringas son de un solo uso.

## TIEMPO DE ESPERA

Carne: 2 días.

Leche: 1 día después del parto si el periodo de secado es superior a 5 semanas. 36 días después del tratamiento en caso de un periodo de secado de 5 semanas o inferior.

## PRECAUCIONES ESPECIALES

No usar la toalla limpiadora en los pezones lesionados.

En caso de uso erróneo durante la lactación, la leche debe descartarse durante 35 días.

## PRESENTACIÓN

Cajas de 24 y 60 jeringas.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 3112 ESP