



CORTEXONA RETARD

Antiinflamatorio esteroideo
en suspensión inyectable



COMPOSICIÓN POR ML

Dexametasona (isonicotinato)..... 1,25 mg

INDICACIONES

Bovino, equino, perros y gatos: Inflamaciones originadas por infecciones, alergias, traumatismos y otras etiologías.

Bovino: Cetosis.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales sometidos a tratamiento inmunológico.

Queda a decisión del veterinario instaurar una terapia de convergencia en los casos contraindicados para su uso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

POSOLOGÍA

Terneros y equino: 1 ml/15,5-62,5 kg p.v., en dosis única.

Vacas: 1 ml/62,5 kg p.v., en dosis única.

Perros: 0,50 ml/3-12,5 kg p.v., en dosis única.

Gatos: 0,25 ml/1-3 kg p.v., en dosis única.

Repetir la dosis, en caso necesario, después de transcurridos 10-14 días de la primera administración.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:

Bovino: 60 días.

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

Leche: 48 horas.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No administrar durante el último tercio de la gestación.

No administrar conjuntamente con antidiabéticos, barbitúricos, diuréticos deflectores de potasio, indometacina, salicilatos, antihistamínicos.

PRESENTACIÓN

Envases con 10 y 50 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 542 ESP