



# EPRIZERO® 5 mg/ml

## SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL CONTINUA PARA BOVINO DE CARNE Y LECHE



Antiparasitario interno y externo para uso tópico

### COMPOSICIÓN POR ML

Eprinomectina..... 5 mg

### INDICACIONES

**Bovino** de carne y leche: Tratamiento de las infestaciones causadas por los siguientes parásitos: Vermes redondos gastrointestinales (adultos y larvas de cuarto estadio): *Ostertagia* spp., *Ostertagia lyrata* (adulto), *Ostertagia ostertagi* (incluyendo inhibidas *O. ostertagi*), *Cooperia* spp. (incluyendo inhibidas *Cooperia* spp.), *Cooperia oncophora*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Cooperia surnabada*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus* spp., *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus helvetianus*, *Oesophagostomum* spp. (adulto), *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris* spp. (adulto). Vermes pulmonares (adultos y larvas de cuarto estadio): *Dictyocaulus viviparus*. Barros (estadios parasitarios): *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*. Ácaros de la sarna: *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei* var *bovis*. Piojos: *Damalinea bovis* (piojo masticator), *Linognathus vituli* (piojo chupador), *Haematopinus eurysternus* (piojo chupador), *Solenopotes capillatus* (piojo chupador). Moscas de los cuernos: *Haematobia irritans*.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica, unción dorsal continua a lo largo de la línea dorsal, aplicando una tira estrecha y extendiendo desde la cruz hasta la base de la cola.

### POSOLOGÍA

1 ml/10 kg p.v.

La lluvia, antes o después del tratamiento, no afectará a la eficacia del medicamento veterinario.

### TIEMPO DE ESPERA

Carne: 10 días.

Leche: 0 horas.

### PRESENTACIÓN

Envases de 1 litro y mochilas colapsables de 2,5 y 5 litros.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2753 ESP