



EXABIOPEN®

Antibacteriano
en suspensión inyectable



ENVASE PET

COMPOSICIÓN POR ML

Bencilpenicilina (procaína).....	200.000 U.I.
Dihidroestreptomina (sulfato)	250 mg

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones bacterianas, posoperatorias y/o secundarias a infecciones víricas, causadas por microorganismos sensibles a la asociación de la bencilpenicilina (procaína) y la dihidroestreptomina (sulfato) tales como:

Bovino y ovino: Absesos cutáneos, actinomicosis, afecciones podales, artritis, carbunco bacteriano, leptospirosis, mastitis, metritis, neumonía y bronconeumonía.

Porcino: Artritis, aborto (por Brucelas, Leptospiras y otros microorganismos sensibles), leptospirosis, mal rojo, neumonía, bronconeumonía y síndrome MMA.

Equino: Metritis, neumonía, bronconeumonía y papera.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con edad inferior a un mes.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

POSOLOGÍA

1 ml/20-30 kg p.v./día.

Continuar el tratamiento hasta 1-2 días después de la remisión de los síntomas.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:

Bovino, porcino y ovino: 30 días.

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

Leche: 3 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No administrar a hembras gestantes por existir riesgo de toxicidad cocleovestibular fetal.

PRESENTACIÓN

Envases PET con 100 y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 590 ESP