



FACILPART® 10 U.I./ml

Oxitócico en solución inyectable

COMPOSICIÓN POR ML

Oxitocina (sintética) 10 U.I.

INDICACIONES

Vacas, cerdas, ovejas, cabras, yeguas, perras y gatas: atonía uterina, agalaxia de la cerda, inducción al parto, mamitis, involución uterina, retención placentaria y metritis. Tratamiento coadyuvante a la terapia antibiótica en mastitis agudas y crónicas.

CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de:

- Distocias por presentación anormal del feto, desproporción pélvico-fetal o cualquier otro tipo de obstrucción mecánica.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Predisposición a ruptura uterina.
- Cuando no exista dilatación del cuello uterino (en inducción al parto).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Obstetricia: Intravenosa, intramuscular o subcutánea.

Eyección láctea: Preferentemente intravenosa.

En caso de administración intravenosa, la inyección debe ser lenta y preferiblemente con suero glucosado o salino.

POSOLOGÍA

Vacas:

Obstetricia: 7,50-10 ml/vaca.

Eyección láctea: 1-2 ml/vaca.

Cerdas, ovejas y cabras:

Obstetricia: 3-5 ml/animal.

Eyección láctea: 0,50-2 ml/animal.

Yeguas:

Obstetricia: 7,50-15 ml/yegua.

Eyección láctea: 1-2 ml/yegua.

Perras:

Obstetricia: 0,50-2,50 ml/perra.

Eyección láctea: 0,20-1 ml/perra.

Gatas:

Obstetricia: 0,50-1 ml/gata.

Eyección láctea: 0,10-1 ml/gata.

La administración puede repetirse cada 30 minutos, si el clínico lo considera necesario.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: Cero días.

Leche: Cero días.

PRESENTACIÓN

Envases con 10, 100 y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 528 ESPNº de registro: 528 ESP