



# FLORFENIS® 300 mg/ml, SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO Y PORCINO



Antibacteriano en  
solución inyectable

## COMPOSICIÓN POR ML

Florfenicol..... 300 mg

## INDICACIONES

Enfermedades causadas por bacterias sensibles al florfenicol.

**Bovino:** Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio en ganado vacuno debidas a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Histophilus somni*.

**Porcino:** Tratamiento de brotes agudos de enfermedad respiratoria porcina causados por cepas de *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella multocida*.

## CONTRAINDICACIONES

No usar en verracos y toros adultos utilizados con fines reproductivos.

No usar en lechones de menos de 2 Kg de peso.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

**Bovino:** Intramuscular o subcutánea. **Porcino:** Intramuscular.

## POSOLOGÍA

### **Bovino:**

Vía intramuscular: 1 ml/15 kg p.v. dos dosis con un intervalo de 48 horas.

Vía subcutánea: 2 ml/15 kg p.v. administrado una sola vez.

No administrar más de 10 ml por punto de inyección para ambas vías. La inyección debe realizarse únicamente en el cuello.

### **Porcino:**

Vía intramuscular: 1 ml/20 kg p.v. en el músculo del cuello, dos dosis con un intervalo de 48 horas. El volumen administrado por punto de inyección no debe exceder 3 ml.

## TIEMPO DE ESPERA

Carne:

**Bovino:** por vía intramuscular, 30 días; por vía subcutánea, 44 días.

**Porcino:** 18 días.

Leche: No usar.

## PRESENTACIÓN

Envases con 100 y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2542 ESP