



FLUMESYVA® PASTA ORAL

Antibacteriano
en pasta oral



COMPOSICIÓN POR GRAMO

Flumequina 30 mg

INDICACIONES

Tratamiento de las infecciones producidas por microorganismos sensibles a la Flumequina.

Lechones: Colibacilosis, enteritis, gastroenteritis, enfermedades neonatales.

Corderos: Colibacilosis, septicemia, pasteurelisis, neumonía enzoótica.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con insuficiencia renal o hepática.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral mediante el dosificador.

POSOLÓGIA

El dosificador que acompaña al envase administra con cada pulsación una dosis de alrededor de 1 g de producto.

Lechones: Una pulsación del dosificador /2,5 kg p.v. cada 12 horas, durante 3-5 días.

Corderos: Una pulsación del dosificador/5 kg p.v. cada 12 horas, durante 4-6 días.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 10 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No exponer al sol a los animales tratados. No asociar con trimetoprima.

PRESENTACIÓN

Envase con 150 g con dosificador.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 580 ESP