



FLUMESYVA® POLVO ORAL

Antibacteriano
en polvo hidrosoluble oral



COMPOSICIÓN POR GRAMO

Flumequina 100 mg

INDICACIONES

Tratamiento de las infecciones producidas por microorganismos sensibles a la Flumequina.

Terneros: Bronconeumonía, enteritis colibacilares, salmonelosis y enfermedades neonatales.

Cerdos: Colibacilosis, enteritis bacterianas, gastroenteritis y enfermedades neonatales.

Corderos: Colibacilosis, pasteurelosis, neumonía enzoótica y septicemia.

Pollos y pavos: Colibacilosis, salmonelosis y pasteurelosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral. Disolver la cantidad del medicamento necesaria en agua y agitar hasta obtener una solución homogénea.

POSOLOGÍA

Terneros: 5 g/50-100 kg p.v., cada 12 horas, durante 5 días.

Lechones: 3 g/25 kg p.v., cada 12 horas, durante 3-5 días.

Cerdos adultos: 3 g/50 kg p.v., cada 12 horas, durante 3-5 días.

Corderos: 0,60 g/10 kg p.v., cada 12 horas, durante 4-6 días.

Pollos y pavos: 1 g/4-8 kg p.v./día, durante 3-5 días.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:

Cerdos y pollos: 2 días.

Pavos, corderos y terneros: 10 días.

Leche: No usar.

Huevos: No usar en un plazo de 4 semanas desde el inicio de la puesta.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No exponer al sol a los animales tratados por peligro de fotosensibilización. No administrar simultáneamente con trimetoprima.

PRESENTACIÓN

Caja con 5 bolsas de 1 kg.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 570 ESP