



FORTICLINA[®] RETARD

Antibacteriano
en solución inyectable



COMPOSICIÓN POR ML

Oxitetraciclina (dihidrato) 200 mg

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina:

Bovino: Infecciones respiratorias, genitales, podales, actinobacilosis, difteria del ternero, mastitis y anaplasmosis bovina.

Porcino: Infecciones respiratorias, genitourinarias, Mal Rojo y onfaloflebitis.

Ovino y caprino: Infecciones respiratorias, genitales, podales, mastitis, aborto enzoótico, onfaloflebitis y poliartritis.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con alteraciones hepáticas o renales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda.

POSOLOGÍA

1 ml/10 kg p.v., en dosis única.

Respetar volumen máximo por punto de inyección de:

Bovino: 15 ml.

Porcino: 10 ml.

Ovino y caprino: 5 ml.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:

Bovino: 30 días

Porcino: 23 días

Ovino y caprino: 24 días.

Leche: No usar.

PRESENTACIÓN

Envases con 100 y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2657 ESP