



# IVERPRAZ

## PASTA ORAL CABALLOS

Antiparasitario interno  
en pasta oral para caballos



### COMPOSICIÓN POR GRAMO

Ivermectina .....	18,7 mg/g
Prazicuantel .....	140,3 mg/g

### INDICACIONES

**Caballos:** Tratamiento de infestaciones mixtas causadas por cestodos y nematodos o artrópodos, debido a vermes redondos adultos e inmaduros, vermes pulmonares, gastrófilos y tenias. Nematodos: Grandes estróngilos: *Strongylus vulgaris* (adultos y larvas arteriales), *Strongylus edentatus* (adultos y estadios larvarios tisulares L4), *Strongylus equinus* (adultos), *Tridontophorus spp.* (adultos); Pequeños estróngilos: *Cyathostomum*: *Cylicocyclus spp.*, *Cylicostephanus spp.*, *Cylicodontophorus spp.*, *Gyalocephalus spp.* (adultos y larvas mucosas no inhibidas); Ascáridos: *parascaris equorum* (adultos y larvas); Oxiuros: *Oxyuris equi* (larvas); Tricostongilidos: *Trichostrongylus axei* (adultos); Estrongiloides: *Strongyloides westeri* (adultos); Habronema: *Habronema spp.* (adultos); Onchocerca: *Onchocerca spp.* Microfilarias p.e. oncocercosis cutánea; Vermes pulmonares: *Dictyocaulus arnfieldi* (adultos y larvas). Cestodos (Tenias): *anoplocephala perfoliata* (adultos), *Anoplocephala magna* (adultos), *Paranoplocephala mamillana* (adultos). Insectos dípteros: *Gasterophilus spp.* (larvas).

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, introduciendo la boquilla de la jeringa en la boca del caballo a través del espacio interdental, y depositando la cantidad requerida de pasta en la parte posterior de la lengua.

### POSOLOGÍA

1,07 g de pasta por 100 kg de peso corporal.

Cada división de la jeringa proporciona pasta suficiente para tratar 50 kg de peso. La jeringa que contiene 7,49 g de pasta permite tratar 700 kg de peso corporal a la dosis recomendada. Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

### TIEMPO DE ESPERA

**Caballos:** Carne: 35 días.

No administrar en yeguas cuya leche se utilice para el consumo humano.

### PRECAUCIONES ESPECIALES

No usar en potros menores de 2 semanas de edad. No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.

En caso de niveles de infestación muy elevados, la destrucción de los parásitos puede provocar ligeros cólicos transitorios y heces blandas en el caballo tratado.

### PRESENTACIÓN

Jeringa con 7,49 g.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2897 ESP