



MARBOSYVA® 100 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO Y PORCINO (CERDAS)



Antibacteriano en solución inyectable

COMPOSICIÓN POR ML

Marbofloxacinó..... 100 mg

INDICACIONES

Bovino: Tratamiento de mastitis aguda causada por cepas de *Escherichia coli* sensibles a marbofloxacinó, durante el periodo de lactancia. Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por cepas sensibles de *Histophilus somni*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma bovis*.

Porcino (cerdas): Tratamiento del Síndrome de Disgalaxia Posparto (SDP), Síndrome Metritis Mastitis Agalaxia (MMA) causado por cepas bacterianas sensibles a marbofloxacinó.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovino:

Mastitis aguda: 1 ml/50 Kg p.v./día durante 3 días consecutivos, por vía intramuscular o subcutánea. La primera inyección puede administrarse por vía intravenosa.

Infecciones respiratorias: 2 ml/25 Kg p.v. inyección única por vía intramuscular. Si el volumen de la inyección es mayor de 20 ml, se debe dividir en dos o más puntos la inyección.

Infecciones respiratorias causadas por *Mycoplasma bovis*: 1 ml/50 Kg p.v./día durante 3 ó 5 días consecutivos, por vía intramuscular o subcutánea. La primera inyección puede administrarse por vía intravenosa.

Porcino (cerdas): 1 ml/50 Kg p.v./día durante 3 días consecutivos por vía intramuscular.

TIEMPO DE ESPERA

Bovino:

Inyección única: Carne: 3 días; Leche: 72 horas.

Inyección diaria: Carne: 6 días; Leche: 36 horas.

Porcino: 4 días

PRESENTACIÓN

Envases con 100 y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2670 ESP