



# NEOVAC

Vacuna inactivada frente al mal rojo porcino en suspensión inyectable



## COMPOSICIÓN POR DOSIS (2 ML)

*Erysipelothrix rhusiopathiae* serotipos 1 y 2..... > 1 PR\*

\* Potencia relativa respecto a la vacuna de referencia.

## INDICACIONES

**Porcino:** Inmunización activa contra el mal rojo.

Inicio de la inmunidad: 2 semanas después de la administración de la segunda dosis.

Duración de la inmunidad: 6 meses después de la administración de la primera dosis.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda en el cuello.

## POSOLOGÍA

2 ml/animal.

Primovacunación: Una dosis a las 12 semanas de edad y una segunda dosis 3-4 semanas más tarde.

Revacunación: Una dosis de recuerdo cada 6 meses. Cuando la presión de infección es elevada (especialmente en cerdo ibérico) administrar cada 3 meses.

Revacunación de cerdas adultas: Una dosis 2 semanas después de cada parto. La protección de los lechones puede asegurarse, si es necesario, administrando una nueva dosis un mes antes del parto, en hembras vacunadas anteriormente.

## TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

## PRESENTACIÓN

Envase con 100 ml (50 dosis).

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2580 ESP