



OXYDRENCH®

Antiparasitario interno
en suspensión oral



COMPOSICIÓN POR ML

Oxfendazol.....	2,5% p/v (25 mg/ml)
Closantel.....	5,0% p/v (50 mg/ml)

INDICACIONES

Ovino: Tratamiento de las infestaciones mixtas de las formas maduras e inmaduras en desarrollo de vermes redondos gastrointestinales, vermes pulmonares, tenias y fasciolas o reznos nasales en ovejas y corderos. Es ovicida frente los huevos de nematodos y retarda la puesta de los huevos en los trematodos (fasciola). El producto está recomendado para el tratamiento de infestaciones mixtas incluyendo: Vermes redondos gastrointestinales: *Ostertagia spp.* (adultos, larvas detenidas e inhibidas), *Haemonchus contortus* (adultos, larvas detenidas e inhibidas), *Nematodirus spp.* incluyendo *N. battus* (adultos e inmaduros), *Cooperia spp.* (adultos e inmaduros), *Trichostrongylus spp.* (adultos e inmaduros), *Oesophagostomum spp.* (adultos e inmaduros), *Chabertia spp.* (adultos e inmaduros). Vermes pulmonares: *Dictyocaulus filaria* (adultos). Tenias: *Moniezia spp.* Reznos nasales: *Oestrus ovis* (larvas). Fasciolas: Fasciolosis crónica y subaguda debida a la Fasciola hepática (formas maduras e inmaduras tardías).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración oral.

POSOLOGÍA

1 ml/5 kg p.v.

Agitar el envase antes de su uso.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 18 días.

Leche: No usar.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Administrar únicamente por vía oral. No sobrepasar la dosis recomendada. No usar durante la gestación y la lactancia.

No usar en ovejas que producen leche para consumo humano.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 y 2,5 litros.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 1531 ESP