



# PANTOYET

Antibacteriano  
en solución inyectable



## COMPOSICIÓN POR ML

Eritromicina base ..... 200 mg

## INDICACIONES

**Bovino:** Tratamiento de la neumonía, tratamiento sistemático de la mastitis, metritis. Pododermatitis infecciosa por anaerobios. Fiebre del transporte.

**Porcino:** Tratamiento de síndromes respiratorios: neumonía, bronquitis y rinitis. Tratamiento de la mastitis y metritis.

**Ovino:** Tratamiento de infecciones de las vías respiratorias superiores.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda.

## POSOLOGÍA

**Bovino:** 1 ml/45-90 kg p.v./día.

**Porcino:** 0,50 ml/15-45 kg p.v./día.

**Ovino:** 0,50 ml/45 kg p.v./día.

No administrar más de 10 ml en el mismo punto de inoculación.

## TIEMPO DE ESPERA

Carne:

**Bovino:** 21 días.

**Porcino y ovino:** 10 días.

Leche:

**Bovino:** 3 días.

**Ovino:** No usar.

## PRECAUCIONES ESPECIALES

La eritromicina, por su naturaleza irritante, puede producir tras la inyección intramuscular, inflamación y dolor en el lugar de aplicación, que desaparece en unos días.

## PRESENTACIÓN

Envase con 50 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 686 ESP