



PARAMECTIN POUR-ON

Antiparasitario interno y externo
en solución para uso tópico



COMPOSICIÓN POR ML:

Ivermectina al 0,5% p/v (5 mg/ml)

INDICACIONES

Bovino: Tratamiento control de las infestaciones causadas por: Vermes redondos gastrointestinales (adultos y cuarto estadio larvario): *Ostertagia ostertagi* incluyendo larvas inhibidas, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia spp*, *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus* (adultos), *Trichuris spp* (adultos). Ocasionalmente, puede observarse una actividad variable frente a *H. placei* (L4), *Cooperia spp*, *T. axei* y *T. colubriformis*. Vermes pulmonares (adultos y cuarto estadio larvario): *Dictyocaulus viviparus*. Vermes oculares (adultos): *Thelazia rhodesii*. Barros (estadios parasitarios): *Hypoderma bovis* e *H. lineatum*. Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei var bovis* y *Chorioptes bovis*. Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus* y *Damalinea bovis*.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a vacas lecheras durante la lactación o en periodo de secado, ni a novillas durante los 60 días previos al parto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unción dorsal. El producto debe aplicarse a lo largo de la línea media dorsal, en una franja estrecha entre la cruz y la base de la cola.

POSOLOGÍA

1 ml/10 kg p.v.

Puede administrarse a vacas de carne durante la gestación o lactancia, siempre que la leche no se destine a consumo humano.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 28 días.

Leche: No usar.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No tratar sobre la piel o pelo húmedo. La lluvia durante las 2 horas posteriores al tratamiento puede reducir la eficacia.

PRESENTACIÓN

Mochilas colapsables con 2,5 y 5 litros.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 1441 ESP