



PARAMECTIN PREMIX PORCINO

Antiparasitario interno y externo
en premezcla medicamentosa oral



COMPOSICIÓN POR GRAMO

Ivermectina 6 mg

INDICACIONES

Porcino: Tratamiento de las infestaciones causadas por los siguientes parásitos en cerdos adultos y de engorde: Vermes gastrointestinales: *Ascaris suum* (adultos y cuarto estadio larvario), *Hyostrogylus rubidus* (adultos y cuarto estadio larvario), *Oesophagostomum spp* (adultos y cuarto estadio larvario), *Strongyloides ransomi* (adultos). Vermes pulmonares: *Metastrongylus spp* (adultos). Piojos: *Haematopinus suis*. Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei var suis*. La administración del medicamento a cerdas gestantes antes del parto controla de forma efectiva la transmisión a través de la leche de *S. ransomi* a los lechones.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración en el alimento.
Para la producción de pienso medicamentoso.

POSOLOGÍA

Cerdos hasta 40 kg p.v.: 333 g de producto por cada tonelada de pienso final.

Cerdos entre 40 kg y 100 kg p.v.: 400 g de producto por tonelada de pienso.

Cerdos por encima de los 100 kg p.v.: 1,67 kg de producto en cada tonelada de pienso final.

Mantener el pienso medicado durante 7 días.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 12 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Los animales severamente enfermos con apetito reducido/anorexia deben ser tratados de forma parenteral.

Para la persona que administre el medicamento a los animales: No fumar, no beber o comer durante la manipulación del medicamento.

Otras precauciones: El estiércol de los animales tratados no se deberá esparcir sobre tierras donde se pueda producir escorrentía.

Usos durante la gestación o la lactancia: A la dosis recomendada no se han observado efectos adversos sobre la fertilidad o la gestación en animales de cría. El medicamento puede administrarse durante la lactancia.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 5 kg.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2778 ESP