



# PIPERACINA SYVA POLVO

Antihelmíntico  
en polvo oral



## COMPOSICIÓN POR GRAMO

Citrato de piperacina ..... 1.000 mg

## INDICACIONES

Tratamiento de las nematodosis intestinales producidas por las formas adultas de los siguientes parásitos:

**Porcino:** *Oesophagostomum spp*, *Ascaris suum*.

**Equino:** *parascaris equorum*, *Oxyrus equi*, *Trichonema spp*.

**Pollos:** *Ascaridia Galli*, *Cappillaria spp*.

## CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con alteraciones de tipo hepático, renal o con historial de ataques generalizados tónico-clónicos.

No administrar a animales debilitados o caquéticos.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, en el agua de bebida o pienso.

## POSOLOGÍA

**Porcino y equino:** 3,1 g/10 kg p.v., en dosis única.

**Aves (pollos):** 0,90 g/10 kg p.v., durante 2 días consecutivos.

Repetir a las 4 semanas.

## TIEMPO DE ESPERA

Carne: 2 días.

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

## PRECAUCIONES ESPECIALES

No administrar simultáneamente con fenotiacinas ni purgantes.

## PRESENTACIÓN

Envases con 1 y 5 kg.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 951 ESP