



## PYRSVAC-183®

Vacuna viva atenuada frente al PRRS,  
liofilizado y disolvente para suspensión  
inyectable



### COMPOSICIÓN POR DOSIS (2 ML)

Virus vivo PRRS, cepa atenuada europea ALL183 .....  $\geq 10^5$  DICC<sub>50</sub>

### INDICACIONES

**Porcino:** Inmunización activa frente al PRRS (síndrome reproductivo y respiratorio porcino).

Reduce los signos clínicos tras la infección por una cepa virulenta del PRRS.

Reduce el índice de transmisión de la enfermedad.

Inicio de la inmunidad: 2 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: 16 semanas tras la vacunación.

### CONTRAINDICACIONES

No usar en animales hipertérmicos, antes de ser transportados o cualquier otra situación que pueda dar origen a inmunosupresión.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

### POSOLOGÍA

2 ml/animal.

### TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

### PRESENTACIÓN

Envase con 50 dosis (10 viales de 5 dosis).

Envase con 50 dosis (2 viales de 25 dosis).

Envase con 500 dosis (20 viales de 25 dosis).

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2918 ESP