



RESPIBOV

Vacuna inactivada polivalente frente a procesos respiratorios y reproductivos en el ganado bovino en suspensión inyectable



COMPOSICIÓN POR DOSIS (4 ML)

Virus de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR)	≥ 1:8 SN*
Virus de la Diarrea Vírica Bovina (BVD)	≥ 1:32 SN*
Virus de la Parainfluenza Bovina tipo 3 (PI-3)	≥ 1:64 SN*
<i>Mannheimia haemolytica</i>	≥ 1:80 ELISA**
<i>Pasteurella multocida</i>	≥ 1:80 ELISA**

* Título mínimo de anticuerpos neutralizantes obtenido tras la inoculación en bovinos.

** Título mínimo de anticuerpos mediante ELISA obtenido tras la inoculación en bovinos.

INDICACIONES

Bovino: Prevención de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), la Diarrea Vírica Bovina (BVD) y los procesos neumónicos originados por el virus Parainfluenza-3, *Mannheimia haemolytica* y *Pasteurella multocida*.

La inmunidad se adquiere a las 2 semanas de la segunda dosis de la primovacunación y se mantiene durante 10 meses.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular o subcutánea.

POSOLOGÍA

4 ml/animal.

Terneros: A partir de 1 mes de vida: Aplicar 2 dosis con un intervalo de 3 semanas. Los terneros vacunados antes del destete deben ser nuevamente vacunados una vez destetados.

Vacuno reproductor: Aplicar 2 dosis con un intervalo de 3 semanas. Revacunar anualmente. Pueden vacunarse las hembras en cualquier momento de la gestación.

TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

PRESENTACIÓN

Blíster con 4 frascos de 4 ml (4 x 1 dosis).

Envase con 100 ml (25 dosis).

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2862 ESP