



SYNPARV

Vacuna inactivada frente a parvovirus porcina en suspensión inyectable



COMPOSICIÓN POR DOSIS (2 ML)

Parvovirus porcino inactivado ≥ 1.280 IH*

* Título de anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación en cobayas.

INDICACIONES

Porcino: Inmunización activa frente a parvovirus.

Inicio de la inmunidad: 3 semanas después de la primovacunación.

Duración de la inmunidad: 3 meses después de la primovacunación.

Puede utilizarse durante la lactancia. Por motivos de eficacia, se recomienda la vacunación antes de la cubrición.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

POSOLOGÍA

2 ml/animal.

Cerdas:

Primovacunación: Dos dosis separadas 4 semanas a los 6-7 meses de vida.

Revacunación: 2-4 semanas antes de cada cubrición/inseminación.

Verracos:

Primovacunación: Dos dosis separadas 4 semanas a los 8 meses de vida.

Revacunación: Cada 6 meses.

TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

PRESENTACIÓN

Envases con 100 ml (50 dosis).

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2910 ESP