



SYNPARV-MR

Vacuna inactivada parvovirus
y mal rojo porcino en emulsión inyectable



COMPOSICIÓN POR DOSIS (2 ML)

Parvovirus porcino inactivado > 1 PR*

Erysipelothrix rhusiopathiae inactivado ≥ 50 U.I.

*Potencia relativa en comparación con la vacuna de referencia.

INDICACIONES

Porcino: Inmunización activa frente a parvovirus porcino y mal rojo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular o subcutánea.

POSOLOGÍA

2 ml/animal.

Cerdas nulíparas:

Primovacunación: A los 6-7 meses de edad.

Vacunación de recuerdo: Al cabo de 3 semanas de la primovacunación.

Revacunar 2-3 semanas antes de la primera cubrición.

Cerdas multíparas:

Vacunación 2-3 semanas antes de la cubrición o inseminación.

Verracos:

Primovacunación: A los 6-7 meses de edad.

Vacunación de recuerdo: Al cabo de 3 semanas de la primovacunación.

Revacunar anualmente.

TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Con el fin de aumentar su fluidez y facilitar la inoculación, es recomendable que la vacuna esté entre 18° C y 25° C en el momento de su aplicación.

PRESENTACIÓN

Envases con 10 ml (5 dosis) y 50 ml (25 dosis).

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2954 ESP