



SYVADOX®-10%

Antibacteriano
en solución oral



COMPOSICIÓN POR ML

Doxiciclina (hiclato) 100 mg

INDICACIONES

Porcino: Tratamiento de las enfermedades de las vías respiratorias producidas por microorganismos sensibles a la doxiciclina.

Pollos: Colibacilosis, CRD y Micoplasmosis.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas, ni con alteraciones hepáticas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, en el agua de bebida.

POSOLOGÍA

Porcino: 1 ml/10 kg p.v./día durante 5 días.

Pollos: 0,1-0,2 ml/kg p.v. durante 3-5 días consecutivos.

El agua medicada será la única fuente de bebida y deberá prepararse nueva cada 24 h.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 7 días.

Huevos: No usar.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Evitar su administración en bebederos oxidados.

No se recomienda su uso en animales gestantes ni durante la lactación.

No usar en aves ponedoras.

PRESENTACIÓN

Envases con 1 y 5 litros

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 1424 ESP