



SYVAQUINOL[®] 100 mg/ml, INYECTABLE

Antibacteriano
en solución inyectable



COMPOSICIÓN POR ML

Enrofloxacinó 100 mg

INDICACIONES

Bovino: Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio, mastitis aguda grave, infecciones del tracto digestivo, septicemias y artritis aguda causadas por cepas sensibles al enrofloxacinó.

Porcino: Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio, del tracto urinario, del tracto digestivo, septicemia y síndrome de disgalactia posparto (SDP)/síndrome de mastitis, metritis y agalactia (MMA) causadas por cepas sensibles al enrofloxacinó.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: Subcutánea o intravenosa lenta.

Porcino: Intramuscular en el cuello, en la base de la oreja.

POSOLÓGÍA

Bovino: 1 ml/20 kg p.v./día, durante 3-5 días, por inyección subcutánea o intravenosa lenta. No administrar más de 10ml en un sólo punto de inyección subcutánea. En Mastitis aguda causada por *Escherichia coli*: 1 ml/20 kg p.v./día, durante 2 días consecutivos, por inyección intravenosa lenta. La segunda dosis puede administrarse por vía subcutánea. En este caso, le corresponderá el tiempo de espera de la vía subcutánea.

Porcino: 0,5 ml/20 kg p.v./día, durante 3 días. No administrar más de 3 ml en un sólo punto de inyección. En Infección del tracto digestivo o septicemia causadas por *Escherichia coli*: 1 ml/20 kg p.v./ día, durante 3 días.

TIEMPO DE ESPERA

Bovino subcutánea:

Carne: 12 días. Leche: 4 días.

Bovino intravenosa:

Carne: 5 días. Leche: 3 días.

Porcino:

Carne: 13 días.

PRESENTACIÓN

Envases con 100 y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 1068 ESP