



SYVAQUINOL 100 mg/ml SOLUCIÓN PARA AGUA DE BEBIDA

Antibacteriano
en solución oral



COMPOSICIÓN POR ML

Enrofloxacinó 100 mg

INDICACIONES

Aves (pollos de engorde): Tratamiento de infecciones causadas por las siguientes bacterias sensibles al enrofloxacinó: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Avibacterium paragallinarum*, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, en el agua de bebida.

CONTRAINDICACIONES

No usar para profilaxis. No usar en caso de que se haya identificado la existencia de resistencia o resistencia cruzada a las (fluoro) quinolonas en el grupo de aves a tratar. No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa, otras (fluoro) quinolonas o a algún excipiente.

POSOLÓGÍA

1 ml/10 kg p.v./día, durante 3-5 días consecutivos. Tratamiento durante 5 días consecutivos en caso de infecciones mixtas y en procesos crónicos.

Dosis recomendada:

$$\frac{\text{ml de medicamento/L de agua} = 10 \text{ mg/kg/día} \times \text{peso medio de animales}}{100 \text{ mg/ml} \times \text{consumo medio de agua (L/día)}}$$

Renovar diariamente el agua medicada. El agua medicada debe ser la única fuente de agua durante todo el tratamiento.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:

Pollos: 7 días.

Huevos: No usar.

No usar en aves ponedoras de reposición en los 14 días previos al inicio de la puesta.

PRESENTACIÓN

Envases con 1 y 5 litros.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 1069 ESP