



YERSYVAC®

Vacuna inactivada yersiniosis o boca roja de los salmónidos en suspensión para aplicación por inmersión



COMPOSICIÓN POR ML

Yersinia ruckeri inactivado serotipo 1, cepa 6565..... $\geq \log_{10}$ U. Agl*
* Título de anticuerpos aglutinantes en suero de conejo (tras la administración de 1 ml de la dilución 1/100 de la vacuna).

INDICACIONES

Salmónidos: Inmunización activa frente a la enfermedad de la boca roja para reducir mortalidad, signos clínicos y/o lesiones de la yersiniosis.

Inicio de la inmunidad: A los 21 días de la vacunación.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en alevines de un peso inferior a 3 g.

No usar en animales reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicación por inmersión.

POSOLOGÍA

Aplicación por inmersión en una dilución 1/200 (250 ml vacuna/50 L agua).

Los peces deberán estar en ayunas desde 36-48 horas antes

250 ml de Yersyvac® permiten vacunar 375 kg de peces, o sea 125.000 alevines de 3 gramos.

TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

PRESENTACIÓN

Envase con 500 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2949 ESP