



MAMIYET V-57

Vacuna inactivada frente a la mastitis bovina en suspensión inyectable



COMPOSICIÓN POR DOSIS (5 ML)

<i>Staphylococcus aureus</i> , cepa ATCC 31885	≥ 1,43 log ₁₀ ELISA*
<i>Streptococcus agalactiae</i> , cepa ATCC 7077	≥ 1,56 log ₁₀ ELISA*
<i>Streptococcus dysgalactiae</i> , cepa ATCC 27957	≥ 1,37 log ₁₀ ELISA*
<i>Arcanobacterium pyogenes</i> , cepa ATCC 8104	≥ 1,62 log ₁₀ ELISA*

* Título medio de ELISA obtenido tras la administración de 1 ml en conejos.

INDICACIONES

Vacas: Inmunización activa frente a las mamitis causadas por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* y *Arcanobacterium pyogenes*.

La inmunidad se adquiere 2 semanas después de completada la primovacunación y se mantiene durante 6 meses.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea.

POSOLOGÍA

5 ml/animal.

Primovacunación: 2 dosis separadas 21-25 días.

Revacunación: Cada 6-7 meses.

Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

PRESENTACIÓN

Blíster con 4 viales de 5 ml (4 x 1 dosis).

Envase con 100 ml (20 dosis).

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 3057 ESP