



SYVA-BAX

Vacuna inactivada polivalente frente a las enterotoxemias en suspensión inyectable



ENVASE POLIPROPILENO

COMPOSICIÓN

Toxide α de <i>Cl. perfringens</i> tipo A.....	$\geq 0,3$ UI α^*
Toxide β de <i>Cl. perfringens</i> tipos B y C.....	≥ 10 UI β^*
Toxide ϵ de <i>Cl. perfringens</i> tipos B y D.....	≥ 5 UI ϵ^*
Toxide α de <i>Cl. septicum</i>	$\geq 2,5$ UI α^*
Toxide α de <i>Cl. novyi</i> tipo B.....	$\geq 3,5$ UI α^*
Toxide de <i>Cl. tetani</i>	$\geq 2,5$ UI α^*
Toxide de <i>Cl. sordellii</i>	100% de protección (en cobayas)**
Anacultivo de <i>Cl. chauvoei</i>	100% de protección (en cobayas)**

* Cantidad suficiente para obtener niveles de anticuerpos neutralizantes por ml de suero de conejo indicados en F. Eur.
** Nivel de protección en cobayas.

INDICACIONES

Bovino, porcino, ovino y caprino:

Inmunización activa frente a enfermedades asociadas a infecciones causadas por *Cl. perfringens* (tipos A, B, C y D), *Cl. septicum*, *Cl. novyi* (tipo B), *Cl. chauvoei*, *Cl. tetani* y *Cl. sordellii*.

La inmunidad activa se adquiere a las 2-3 semanas de la segunda dosis y se mantiene durante 6 meses.

La inmunidad pasiva en crías recién nacidas de madres vacunadas, se adquiere tras la adecuada ingesta de calostro y se mantiene hasta los 50 días de vida.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovino, ovino y caprino: Subcutánea.

Porcino: Intramuscular.

POSOLOGÍA

Bovino: 5 ml/animal.

Porcino: 2 ml/animal.

Primovacunación adultos: Dos inoculariones separadas 4 semanas. Revacunación adultos: Cada 6 meses (una dosis).

Ovino y caprino: 2 ml/animal.

Terneros, lechones, corderos y cabritos: En la primovacunación se aconseja la administración de dos dosis separadas 4 semanas a partir de la 2ª semana de vida si proceden de madres no vacunadas y a partir de la 12ª semana si proceden de madres vacunadas.

Reproductoras: Primovacunación: dos dosis de vacuna 8 y 4 semanas respectivamente antes de la fecha prevista para el parto. Revacunación: Una sola dosis 3 semanas antes de cada siguiente parto.

TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

PRESENTACIÓN

Envase de polipropileno con 100 y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2824 ESP