



# BENZATARD

Antibacteriano  
en suspensión inyectable



## COMPOSICIÓN POR ML

Bencilpenicilina benzatina.....	150.000 U.I.
Bencilpenicilina procaína.....	150.000 U.I.

## INDICACIONES

Tratamiento de infecciones bacterianas, causadas por microorganismos sensibles a la asociación, tales como: **Porcino:** Procesos respiratorios asociados a *Pasteurella multocida*, *Streptococcus suis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*. Mal rojo (*Erysipelothrix rhusiopathiae*). Infecciones asociadas a *Arcanobacterium pyogenes* y *Streptococcus suis*. **Equino:** Afecciones cutáneas y podales asociadas a *Arcanobacterium pyogenes* y *Fusobacterium necrophorum*. Neumonía y bronconeumonía asociadas a *Staphylococcus* spp. y *Streptococcus* spp. Papera equina (*Streptococcus equi* subsp. equi.). Metritis asociada a *Actinomyces pyogenes*. **Perros y gatos:** Amigdalitis, traqueobronquitis y neumonía asociadas a *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. y *Nocardia*.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular. No inyectar por vía intravenosa o en las proximidades de un nervio importante.

## POSOLOGÍA

**Porcino y equino:** 1 ml/25 kg p.v., en dosis única.

Respetar volumen máximo por punto de inyección de 5 ml para porcino y 10 ml para equino.

**Perros y gatos:** 0,5 ml/5 kg p.v., en dosis única.

Puede repetirse la misma dosis a las 72 horas.

## TIEMPO DE ESPERA

Carne:

**Porcino:** 78 días.

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

## PRECAUCIONES ESPECIALES

No usar en animales en periodo de lactación.

No administrar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos, fenilbutazona, sulfamidas, salicilatos y otros ácidos débiles

## PRESENTACIÓN

Envase con 100 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 589 ESP