



SYVAQUINOL® 25 mg/ml, INYECTABLE

Antibacteriano
en solución inyectable



COMPOSICIÓN POR ML

Enrofloxacinó 25 mg

INDICACIONES

Porcino (lechones): Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio, digestivo y septicemia causadas por cepas sensibles al enrofloxacinó.

Perros: Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo, respiratorio, del aparato genitourinario, infecciones de la piel y las heridas y otitis (externa/media) causadas por cepas sensibles al enrofloxacinó.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con historial clínico epiléptico o de convulsiones. No usar en perros jóvenes durante su crecimiento, es decir, en perros de razas pequeñas menores de 8 meses, perros de razas grandes menores de 12 meses y perros de razas gigantes menores de 18 meses.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Lechones: Intramuscular en el cuello, en la base de la oreja.

Perros: Subcutánea.

POSOLÓGÍA

Lechones: 1 ml/10 kg p.v./día, durante 3 días, por vía intramuscular en el cuello. No administrar más de 3 ml por punto de inoculación. En infecciones del tracto digestivo o septicemias causadas por *Escherichia coli*: 2 ml/10 kg p.v./día, durante 3 días.

Perros: 2 ml/10 kg p.v./día, durante máximo 5 días, por vía subcutánea.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 13 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Se recomienda precaución con el uso concomitante de flunixinó y enrofloxacinó en perros para evitar reacciones adversas.

PRESENTACIÓN

Envase con 100 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 1071 ESP