



MEGANYL

Antiinflamatorio no esteroideo, analgésico y antipirético en solución inyectable



COMPOSICIÓN POR ML

Flunixinio (meglumina)..... 50 mg

INDICACIONES

Bovino: Control de la inflamación aguda y control de la pirexia asociada a la enfermedad respiratoria bovina.

Porcino: Reducción de la inflamación y alivio del dolor asociados al síndrome MMA.

Equino: Reducción de la inflamación y alivio del dolor asociados a los trastornos músculo-esqueléticos en estados agudos y crónicos. Alivio del dolor visceral asociado al cólico.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con enfermedad hepática o renal, cuando exista la posibilidad de úlceras o hemorragias digestivas, con signos de discrasias sanguíneas, deshidratados, hipovolémicos o hipotensos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovino y equino: Intravenosa.

Porcino: Intramuscular profunda.

POSOLOGÍA

Bovino: 2 ml/45 kg p.v. cada 24 horas. Máximo 3 días.

Porcino: 2 ml/45 kg p.v. 1 ó 2 inyecciones separadas por un intervalo de 12 horas.

Equino: 1 ml/45 kg p.v. cada 24 horas. Máximo 5 días.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:

Bovino: 4 días.

Porcino: 24 días.

Equino: 4 días.

Leche:

Bovino: 24 horas.

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No administrar conjuntamente con otros AINES y fármacos potencialmente nefrotóxicos.

La administración conjunta con corticoides puede aumentar la toxicidad de ambos, incrementando el riesgo de úlceras gastrointestinales.

PRESENTACIÓN

Envases con 100 y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 1763 ESP