



# NEO-BACTERINA

Vacuna inactivada frente a las infecciones por pasteurellas en suspensión inyectable



## COMPOSICIÓN POR DOSIS (2 ML)

<i>Pasteurella multocida</i> , cepas P-1062 y 11-A.....	≥ 1:20 ELISA*
<i>Mannheimia haemolytica</i> , cepas 43270 y S 10R.....	≥ 1:16 ELISA*
Leucotoxoides de <i>M. haemolytica</i> .....	≥ 1:40 ELISA*

\* Título de anticuerpos determinado mediante ELISA en conejos vacunados.

## INDICACIONES

### Bovino, ovino y caprino:

Inmunización activa y pasiva para reducir la mortalidad, signos clínicos y lesiones producidas por *Pasteurella multocida* y *Mannheimia haemolytica*.

La inmunidad se adquiere a las 3 semanas de la segunda dosis de la primovacunación y se mantiene durante 6 meses.

## CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con hipertermia o inmediatamente antes de ser transportados. No usar en animales enfermos o estresados.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda en el cuello o subcutánea en la zona de la axila.

## POSOLOGÍA

2 ml/animal.

**Terneros, corderos y cabritos:** 2 dosis separadas entre 2-4 semanas a partir de la primera semana de vida si proceden de madres no vacunadas y a partir de los 45-50 días si proceden de madres vacunadas.

Revacunar a los 6 meses.

**Reproductores:** 2 dosis separadas entre 2-4 semanas en el último tercio de la gestación en las hembras reproductoras.

Revacunar en cada nueva gestación.

## TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

## PRESENTACIÓN

Envases con 100 ml (50 dosis) y 250 ml (125 dosis).

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2835 ESP