



AMOXOIL RETARD

Antibacteriano
en suspensión inyectable



ENVASE PET

COMPOSICIÓN POR ML

Amoxicilina (trihidrato) 150 mg

INDICACIONES

Bovino, porcino, ovino, perros y gatos: Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la amoxicilina localizadas en el tracto digestivo, respiratorio, urogenital, piel y tejidos blandos, así como complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular. No administrar por vía intravenosa.

POSOLOGÍA

1 ml/10 kg p.v. en dosis única.

En caso necesario, repetir la administración a las 48 horas.

Respetar un volumen máximo por punto de inyección de:

Bovino: 20 ml.

Porcino y ovino: 5 ml.

Agitar el envase antes de su uso.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:

Bovino y ovino: 50 días.

Porcino: 25 días.

Leche: 4 días (96 horas).

PRECAUCIONES ESPECIALES

No manipular el medicamento si es alérgico a las penicilinas y/o cefalosporinas.

PRESENTACIÓN

Envases con 100 ml y 250 ml.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 346 ESP