



# AQUAMICIN POLVO

Antibacteriano  
en polvo hidrosoluble oral



## COMPOSICIÓN POR GRAMO

Neomicina (equivalente a 700 mg de neomicina sulfato)..... 490 mg

## INDICACIONES

**Terneros:** Colibacilosis y salmonelosis.

**Cerdos:** Colibacilosis, salmonelosis, disentería vibriónica y enfermedad de los edemas.

**Potros:** Infecciones bacterianas del tracto gastrointestinal.

**Pollos:** Diarreas inespecíficas y salmonelosis.

**Perros:** Infecciones bacterianas del tracto gastrointestinal.

## CONTRAINDICACIONES

No administrar a bóvidos una vez iniciada la rumia.

No administrar a animales deshidratados, con insuficiencia renal o con depresión respiratoria.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, directamente o disuelto en el agua de bebida, leche o lacto-reemplazante. Preparar diariamente la solución de bebida.

## POSOLOGÍA

**Terneros:** 1 g/28-70 kg p.v./día, cada 6-12 h.

**Cerdos:** 1 g/28 kg p.v./día.

**Potros:** 1 g/70-140 kg p.v./día, cada 12-24 h.

**Pollos:** 0,032% en pienso o agua de bebida.

**Perros:** 0,5 g/14-35 kg p.v./día, cada 6 h.

Prolongar el tratamiento durante 3-5 días.

## TIEMPO DE ESPERA

Carne:

**Terneros:** 30 días.

**Cerdos:** 1 día.

**Pollos:** 5 días.

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

## PRECAUCIONES ESPECIALES

No administrar con bloqueantes neuromusculares, anestésicos generales, antiuréticos u otros aminoglucósidos.

## PRESENTACIÓN

Envase de 5 kg (5x1 kg).

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 1.242 ESP