



DEXABIOPEN®

Antibacteriano y antiinflamatorio esteroideo en suspensión inyectable



ENVASE PET

COMPOSICIÓN POR ML

Bencilpenicilina procaína.....	200.000 U.I.
Dihidroestreptomicina	200 mg
Dexametasona	0,50 mg

INDICACIONES

Infecciones causadas por microorganismos sensibles a la bencilpenicilina y a la dihidroestreptomicina y que cursan con inflamación aguda:

Bovino: Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por *Pasteurella multocida*.

Porcino: Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por *Actinobacillus pleuropneumoniae* y/o *Pasteurella multocida*. Meningitis causada por *Streptococcus suis*, *Listeria monocytogenes* y/o *Haemophilus parasuis*. Enfermedad de Glässer causada por *Haemophilus parasuis*.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con hipersensibilidad a algunos de sus componentes, infecciones víricas y/o fúngicas, edad inferior a un mes o animales sometidos a tratamiento inmunológico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda.

POSOLOGÍA

Bovino y porcino: 1 ml/10-20 kg p.v./día, durante 3 días.

TIEMPO DE ESPERA

Carne:

Bovino: 56 días.

Porcino: 68 días.

Leche: 60 horas.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No manipule el medicamento si es alérgico a las penicilinas, cefalosporinas u otros componentes del medicamento.

No utilizar el medicamento durante el último tercio de la gestación.

No administrar durante más de 3 días consecutivos, continuando posteriormente el tratamiento con antibióticos sin corticoesteroides.

PRESENTACIÓN

Viales de vidrio de 10, 50, 100 y 250 ml.

Viales de politereftalato de etileno (PET) de 100 y 250 ml.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 2549 ESP